AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"
(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36-01-74

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.
PROTECTION DES VÉGÉTAUX
C. C. P. RENNES 9404-04

Imprimerie de la station "Bretagne" - *Directeur-Gérant* : P. JOURNET — Numéro du certificat d'inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presses : 528 AD

BULLETIN N° 11 — 18 JUIN 1979

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Un traitement contre le Carpocapse (ver des fruits) est préconisé pendant la période du 21 au 23 juin. Dans les vergers où des taches de Tavelure sont présentes, adjoindre un fongicide contre cette maladie.

MALADIES ET RAVAGEURS DES CEREALES

BLE D'HIVER : Stade végétatif moyen : floraison.

Septoriose : Les conditions climatiques de ces derniers jours sont demeurées très favorables à la maladie. Le traitement préconisé dans le précédent bulletin peut encore être fait sur les parcelles les plus tardives atteintes de Septoriose.

Pucerons : Leur apparition est constatée dans quelques cultures. Toutefois, les niveaux de population sont généralement très bas et ne nécessitent aucun traitement. Nous rappelons qu'au stade actuel, le seuil d'intervention se situe à 10 pucerons en moyenne par épi, soit un épi colonisé sur deux. Pour apprécier le niveau d'infestation, un comptage sur 100 épis pris au hasard est nécessaire.

POIS

Mildiou : De fortes attaques sont constatées en de nombreux secteurs. Pour éviter les dégâts sur gousses et grains, un traitement est préconisé dès que possible avec l'un des produits utilisés contre le Mildiou de la pomme de terre.

Sur pois en fleur, adjoindre un fongicide efficace contre Botrytis et Sclérotinia (se reporter à notre bulletin du 8 juin : maladies cryptogamiques du haricot).

Pucerons : Bien surveiller les cultures, notamment en début de floraison. Si la présence de ces insectes était constatée, intervenir avec un produit non dangereux pour les abeilles : bromophos, diéthion, endosulfan, phosalone, pyrimicarbe, pyréthrines synergisées, roténone.

G. CHERBLANC
Chef de la Circonscription
Phytosanitaire "Bretagne"

Dernière note : Bulletin n° 10 du 8 juin 1979